

Tratamiento del pinzamiento femoroacetabular en una paciente de 11 años, reporte de un caso.

Edgardo Ulises Hernandez Sepulveda

Residente de 3er año de Traumatología y ortopedia Hospital Civil de Culiacán

Introducción: El pinzamiento femoroacetabular (PFA) se define como un contacto anormal entre el acetabulo y la union de la cabeza-cuello femoral (1) con prevalencia de hasta 15% (3), se reconocen 2 variantes; el tipo CAM que obedece a un abultamiento entra la zona de transición entre cabeza y cuello femoral el predomina en hombres y otro tipo Pincer mas común en mujeres donde se encuentra una sobrecobertura acetabular (1) asociándose a coxas profundas (2).

Método: Reporte de caso de una femenina de 11 años con diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular izquierdo tipo CAM que inicia con dolor en cadera izquierda y limitación de los arcos de movilidad de la misma de manera activa y pasiva corroborado mediante radiografías y resonancia magnética.

Resultados: Se realizó una artrotomía de cadera izquierda con remodelación del defecto óseo, actualmente a dos meses PO presenta buena evolución clínica con desaparición del dolor y con ausencia de bloqueo de la cadera, mejoría clínica en los grados de los arcos de movilidad.

Discusión y conclusiones: se ha demostrado que el diagnóstico del PFA es complejo, sin embargo el tratamiento quirúrgico artroscopico o por artrotomía demuestra una mejora significativa en los arcos de movilidad activo-pasivos, la deambulacion y el dolor.